




Abbildung 1: Gemeldete FSME-Erkrankungen in Sachsen 2001 - 2019




Abbildung 2: FSME-Risikogebiete in Sachsen 2020




Abbildung 3: Vorkommen autochthoner FSME-Fälle in Sachsen 2019 nach Expositionsort

Hinweis: In Abbildung 3 wurden die FSME-Erkrankungen den Stadt- und Landkreisen zurechnet, in denen die Infektion mutmaßlich erworben wurde. Die Darstellung repräsentiert nicht die Auswertungen nach Meldekreisen. Siehe hierzu folgende Tabelle:

Tabelle: Gemeldete FSME-Erkrankungen nach Stadt- und Landkreisen in Sachsen

Land-/Stadtkreis	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
LK Bautzen					1						2		2	2		2	1	1	1
LK Erzgebirgskreis				1	1					1				2			7		5
LK Görlitz				1	1	1								1				1	
LK Leipzig																1			
LK Meißen		1		1		2			1	1				1	1				1
LK Mittelsachsen		1			1												1		1
LK Nordsachsen				1												1	1		
LK Säch. Schweiz-Osterzgeb.		1	1					1							1	1	3	1	3
LK Vogtlandkreis	1									1	2	1	5	8	2	1	2	3	8
LK Zwickau		1								1			1			1	1		2
SK Chemnitz		1	2	1	1		1			1		1		1	1	2	3	4	2
SK Dresden						1	1		3		1	2		1					
SK Leipzig										1			1			1	2	2	4
Sachsen, insgesamt	1	4	3	5	5	4	2	1	4	5	5	4	6	15	6	10	21	12	27
nicht autochthon erworben	1	1	2	3	3	1	2		2	4		1	2	2		3	4	4	2
autochthon erworben		3	1	2	2	3		1	2	1	5	3	4	13	6	7	17	8	25
Deutschland	255	239	277	275	432	546	239	289	313	260	424	195	420	265	223	348	485	583	445*

* SurvStat-Datenstand 01.03. des Jahres (für 2019 nur vorläufig - 26.01.2020)