

## Start der Grippesaison 2026/27: Schützen Sie sich rechtzeitig durch eine Impfung!

Aktuell sind in Sachsen die Meldezahlen für Influenza- sowie RS-Viren seit der 33. Kalenderwoche (Ende August) leicht angestiegen, befinden sich aber noch auf niedrigem Niveau. Zwischen beiden Influenzasaisons bereits zwei Influenza-bedingte Todesfälle gemeldet: Eine 87-jährige Frau sowie ein 67-jähriger Mann. Bei beiden wurde eine Influenza A-Infektion nachgewiesen und der Impfstatus war nicht ermittelbar.

Tabelle 1: Influenza-, COVID-19- und RSV-Meldedaten nach IfSG in Sachsen, 30. bis 37. Meldewoche 2026, Datenstand 18.09.2026

| Fälle absolut |           |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|               | Influenza | 30. MW | 31. MW | 32. MW | 33. MW | 34. MW | 35. MW | 36. MW | 37. MW |
|               | COVID-19  | 4      | 8      | 12     | 11     | 16     | 16     | 11     | 18     |
|               | RSV       | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 0      | 0      | 1      |

In der Saison 2025/2026 setzte sich der stetige Abfall der Influenza-Impfquote weiter fort. Der Ziel-Durchimpfungsgrad der Europäischen Union von 75 % für Senioren wird weiterhin weit verfehlt (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Influenza-Impfquoten in der Saison 2025/2026 (Datenstand 31.12.2025) in Sachsen pro Altersgruppe ab 60 Jahren

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 60 Jahre bis 69 Jahre | 28,2 % |
| 70 Jahre bis 79 Jahre | 44,1 % |
| 80 Jahre bis 89 Jahre | 58,2 % |
| ab 90 Jahre           | 64,6 % |

*Eine gleichzeitige Impfung gegen das Coronavirus ist möglich, sollte jedoch – im Gegensatz zur Influenza-Impfung - nach aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission bereits möglichst zu Beginn der COVID-19-Saison im Spätsommer oder Frühherbst erfolgen.*